

- Uvod • Simptomi i dijagnoza • Liječenje

Uvod Crijevna limfangiektazija je bolest djece i mladih odraslih osoba pri kojoj se povećavaju limfne žile koje opskrbljuju sluznicu tankog crijeva.

Povećanje limfnih žila može biti mana pri rođenju, ili može kasnije u životu nastati zbog upale gušterače (pankreatitisa) ili ukrućenja vreće oko srca, perikarda (konstriktivni perikarditis), što povećava pritisak u limfnom sistemu.

Simptomi i dijagnoza Osoba sa limfangiektazijom ima jako zadržavanje tekućine (edeme) zbog toga što tkivna tekućina ne može djelotvorno otjecati kroz povećane, ali sužene limfne žile. Otok može nejednako zahvatiti dijelove tijela ovisno o tome koja je limfna žila zahvaćena, npr. tekućina se može nakupljati u trbušnoj i pleuralnoj šupljini.

Mogu nastati i mučnina, blagi proljev i bol u trbuhu. U krvi se može sniziti broj limfocita. Gubi se bjelančevina, jer kroz natečene limfne žile limfa izlazi u crijevo i stolicu pa je nivo bjelančevina u krvi snižen. Nizak nivo bjelančevina može uzročiti daljnje oticanje tkiva. Nivoi holesterola u krvi mogu biti nenormalno niski, jer se holesterol iz hrane dobro ne apsorbira. Neki ljudi imaju i masne stolice.

Za pomoć u dijagnosticiranju te bolesti doktor može koristiti intravensku injekciju radioaktivno obilježenog albumina. Ako se u stolici pojave nenormalne količine radioaktivne tvari, osoba ima prekomjerni gubitak bjelančevine. Biopsija tankog crijeva pokazuje da su limfne žile povećane.

Liječenje Crijevna limfangiektazija se liječi otklanjanjem uzroka povećanja limfnih žila, npr. liječenje konstriktivnog perikarditisa može olakšati pritisak na limfne žile.

Neki se ljudi oporavljaju uzimanjem hrane sa niskim sadržajem masti i uzimanjem dodataka nekih triglicerida, koji se u krv apsorbiraju izravno, a ne preko limfnih žila. Ako je zahvaćen samo malen dio crijeva, može se ukloniti hirurškim putem.