

Pityriasis rosea je blaga bolest koja uzrokuje ljuštenje upaljene, ružičasto obojene kože.

Pityriasis roseu vjerojatno uzrokuje neki zarazni činioc, premda se nijedan nije otkrio. Može se razviti u svakoj životnoj dobi, ali je najčešća u mladih odraslih osoba. Obično se javlja u proljeće i jesen.

Simptomi pitirijaze

Pityriasis rosea počinje kao ružičasto-crveno ili svjetlo žućkasto-smeđe područje koje doktori zovu grb ili majčina mrlja. To okruglo ili ovalno područje obično se razvije na gornjem dijelu trupa. Za 5-10 dana po gornjem dijelu trupa pojavljuje se mnogo sličnih ali manjih mrlja. Te sekundarne mrlje su najčešće na gornjem dijelu trupa, posebno uzduž kičme ili se šire od nje. Većina ljudi sa pityriasis rosea imaju malo simptoma a osip obično ne svrbi. Međutim, mogu se javiti umor, glavobolja i ponekad iscrpljujući svrbež.

Liječenje pitirijaze

Obično osip nestaje za 4-5 sedmica bez liječenja, premda katkada traje 2 mjeseca i dulje.

I umjetno i prirodno sunčevo svjetlo doprinose bržem liječenju pityriasis roseae i umanjuje svrbež. Svrbež može ublažiti krema koja sadrži mentol. Rijetko se za jaki svrbež propisuju kortikosteroidi.