

Celulitis je infekcija koja se širi u kožu a katkada ispod, u dublje slojeve kože.

Celulitis najčešće nastaje zbog streptokokne infekcije ili naročito nakon neke rane inficirane stafilokokom. Međutim, celulitis mogu uzročiti mnoge druge bakterije, naročito nakon ugriza ljudi ili životinja ili nakon ozljede u vodi.

Infekcija je najčešće na nogama a počinje oštećenjem kože manjom ozljedom, ranom ili gljivičnom infekcijom između nožnih prstiju. Kod celulitisa dolazi do nateknuća, osjetljivosti, topline i crvenila. Neka područja mogu izgledati podlivena krvlju i mogu se razviti mali mjehuri.

Simptomi celulitisa

Može se javiti povišena temperatura, tresavica, glavobolja i teške komplikacije kao što su zbunjenost, nizak krvni pritisak (hipotenzija) i ubrzani rad srca (tahikardija).

Doktor obično lako prepozna celulitis, ali je teže prepoznati bakterije koje uzrokuju infekciju. Doktori obično uzimaju uzorke krvi (a katkada uzorke kože) i pošalju ih u laboratorij gdje bakterije rastu u kulturi.

Liječenje celulitisa

Brzim liječenjem može se spriječiti brzo širenje infekcije i njeno dolaženje u krv i druge organe. Celulitis se često liječi penicilinom ili lijekom tipa penicilina, kao što je dikloksacilin. Ljudi sa blagim celulitisom mogu uzimati antibiotike oralno, stariji ljudi i ljudi u kojih se celulitis brzo širi, ljudi sa visokom temperaturom ili sa drugim znakovima ozbiljne infekcije obično dobivaju injekciju antibiotika prije početka davanja antibiotika oralno.

Ako su zahvaćene noge, povišeno držanje nogu i primjena hladnih vlažnih obloga olakšavaju nelagodnost i smanjuju otok.

Ako se celulitis ponovi, vjerojatno se radi o nekom uzročnom stanju, kao što je atletsko stopalo, koje osobu čini sklonom celulitisu pa ga također treba liječiti.