

Kaposijev sarkom je rak koji proistječe iz krvnih žila, obično kože.

Kaposijev sarkom ima dva oblika.

- Jedan je bolest starijih ljudi, obično europskog, židovskog ili italijanskog porijekla, u

kjih kancerogene izrasline na koži rastu vrlo polagano i rijetko se šire.

- Drugi se oblik javlja u djece i mladih muškaraca u ekvatorskoj Africi i u ljudi sa AIDS-om. Taj oblik Kaposijeva sarkoma raste mnogo brže i često zahvaća krvne žile u unutarnjim organima.

Kod starijih muškaraca Kaposijev sarkom se obično pojavljuje kao grimizna ili tamno smeđa mrlja na nožnim prstima ili nogama. Rak može rasti do deset centimetara ili više, kao tamno, plitko ili lagano uzdignuto područje, koje lako krvari i pretvara se u ranu. Rak se može polako širiti uz nogu.

U Afrikanaca i ljudi sa AIDS-om, Kaposijev sarkom obično se najprije javlja kao ružičasta, crvena ili ljubičasta mrlja koja može biti okrugla ili ovalna. Te se mrlje mogu pojaviti bilo gdje na tijelu, često na licu. Za nekoliko mjeseci mrlje se mogu pojaviti na nekoliko mjesta na tijelu

uključujući usta, mogu se razviti i u unutarnjim organima i limfnim čvorovima gdje mogu uzročiti unutarnje krvarenje.

Liječenje Kaposijevog sarkoma

Starije ljude sa Kaposijevim sarkomom koji raste polako i bez drugih simptoma uopće ne

treba liječiti. Mrlje se mogu liječiti smrzavanjem, radioterapijom (zračenjem) ili elektrokauteriziranjem (razaranje tkiva upotrebom električne sonde).

Kod ljudi sa AIDS-om i drugih sa agresivnijim oblikom liječenje nije bilo jako uspješno. Kemoterapija uz upotrebu lijekova kao što su etopozid, vinkristin, vinblastin, bleomicin i doksorubicin dala je razočaravajuće rezultate. Interferon-alfa može usporiti napredovanje ranih kožnih izraslina, a injiciranjem vinkristina u izraslinu može se postići njihovo povlačenje. Čini se da liječenje Kaposijeva sarkoma ne produžuje život ljudi sa AIDS-om. Do povlačenja Kaposijeva sarkoma može dovesti poboljšanje imunološkog statusa.