

U muškaraca i žena može se razviti prekomjerna dlakavost (hirsutizam) na dijelovima kože koji obično nisu jako dlakavi. To nasljedno obilježje često postoji u obiteljima, naročito među ljudima mediteranskog porijekla. U žena i djece prekomjerna dlakavost može nastati zbog poremećaja hipofize ili nadbubrežnih žlijezda što dovodi do prekomjerne proizvodnje muških (virilizirajućih) steroida.

Prekomjerna dlakavost česta je nakon menopauze i u ljudi koji koriste anaboličke steroide ili kortikosteroide. Stanje se može razviti i u ljudi koji koriste neke druge lijekove kao što je lijek povišenog krvnog pritiska minoksidil. Ljudi koji imaju porfiriju kutaneu tardu također mogu imati prekomjernu dlakavost.

Liječenje

Doktor najprije utvrđuje uzrok prekomjernog rasta dlake. Često nisu potrebne laboratorijske pretrage, ali ako se sumnja na neki endokrini poremećaj, mogu se odrediti pretrage krvi.

Kao privremeno rješenje dlake se mogu obrijati. Ostale česte privremene mjere uključuju čupanje, uklanjanje voskom i upotrebu depilatora. Ako osoba ima tanku dlaku, izbjeljivanjem dlake može se stanje zamaskirati.

Da bi se dlake trajno uklonile, mora se folikul dlake razoriti. Jedino sigurno trajno liječenje je elektroliza.