

- Uvod
- Simptomi i dijagnoza
- Liječenje i prevencija

Uvod

Zaraza ribljom trakavicom (difilobotrijaza) je crijevna zarazna bolest koju uzrokuje odrasla trakavica *Diphyllobotrium latum*.

Riblja trakavica se pojavljuje u Europi (naročito u Skandinaviji), Japanu, Africi, Južnoj Americi, Kanadi i Sjedinjenim Državama (naročito Aljaska i područje Velikih Jezera). Zarazu često uzrokuje jedenje sirove ili nedovoljno kuhane slatkovodne ribe.

Odrasli crv ima nekoliko hiljada odsječaka (proglotida) koji sadrže jajašca i dugačak

je 4,5-9 metara. Proglotide ispuštaju jajašca u crijevo a izbacuju se stolicom. Iz jajašca se izlegu u slatkoj vodi embriji koje pojedu mali rakovi. Rakove opet pojedu ribe. Ljudi se zaraze kada jedu sirovu ili nedovoljno kuhanu zaraženu slatkovodnu ribu.

Simptomi i dijagnoza

Zaraza obično ne izaziva simptome, premda neki ljudi mogu osjetiti nelagodnost u crijevima. U rijetkim slučajevima, trakavice uzrokuju anemiju lišavanjem čovjeka vitamina B12. U stolici se nalaze jajašca.

Liječenje i prevencija

Zaraza se može spriječiti pomnim kuhanjem slatkovodne ribe ili smrzavanjem na -10°C tokom 48 sati. Zarazu se liječi oralnim (na usta) pripravcima niklozamida ili prazikvantela.