

• Uvod • Simptomi i dijagnoza • Prognoza

Uvod

»Čista« chorea minor razlikuje se znatno od chorea minor u bolesnika sa spoliartritisom i karditisom. U pitanju su bolesnici bez kliničkih i laboratorijskih znakova reumatske aktivnosti, afebrilni. Nema podataka o prethodnoj infekciji gornjih dijelova disajnih organa. ASTO titar je u normalnim granicama.

Simptomi i dijagnoza

Chorea minor se lako dijagnosticuje kada su izraženi svi klinički simptomi. Teškoće nastaju u ranoj fazi obolenja, kada nisu izraženi svi klasični znaci. U nekim slučajevima, pokreti bolesnika sa chorea minor mogu da liče na pokrete bolesnika sa athetosis.

Prognoza

Prognoza je ista kao i u bolesnika sa akutnom reumatskom groznicom, a u kojih nisu postojali znaci chorea minor. U pogledu srca, bolesnici sa »čistom« chorea minor imaju bolju prognozu. Recidivi su mogući.

Iako još ne postoje podaci o rezultatima i koristima koje ovi bolesnici imaju od primjene dugotrajne profilakse od streptokokne infekcije, ipak se ovim bolesnicima predlaže profilaktičko liječenje antibioticima, i to po izliječenju prvog napada chorea minor.