

- Uvod • Simptomi • Dijagnoza i liječenje

**Uvod** Kičmeni (spinalni) hematom nastaje kad se krv nakuplja oko kičmene moždine i pritišće je.

Hematom može nastati zbog povrede leđa, od nenormalne krvne žile (arteriovenska nenormalnost) ili zbog krvarenja u ljudi koji uzimaju sredstva protiv zgrušavanja krvi ili imaju sklonost krvarenju.

**Simptomi** Hematom obično uzrokuje naglu bol i osjetljivost nakon čega dolazi do slabosti i gubitka osjeta ispod zahvaćenog područja kičmene moždine. Ti učinci mogu unutar minuta ili sati napredovati do potpune paralize, premda se ljudi katkada spontano oporave. Katkada krv teče prema gore u mozak uzrokujući čak još teže probleme, ako hematom u blizini vrha kičmene moždine smeta sposobnosti disanja, mogući su koma i smrt.

**Dijagnoza i liječenje**

**Dijagn**

Doktor postavlja prvu dijagnozu na temelju simptoma i obično je potvrđuje sa MRI, premda se katkada koristi CT ili mijelogram. Trajnu ozljedu kičmene moždine može spriječiti hitno uklanjanje nakupljene krvi. Arteriovensku nenormalnost može katkada popraviti hirurgija korištenjem posebnih tehnika (mikrokirurgija). Ljudima koji uzimaju sredstva protiv zgrušavanja krvi (antikoagulanse) ili imaju poremećaj krvarenja daju se lijekovi da se ukloni ili smanji sklonost krvarenju.