

• Uvod • Dijagnoza • Prognoza

Uvod

Pod presbiakuzisom podrazumijevamo perceptivno oštećenje sluha koje se javlja kod starijih ljudi, a koje stavljamo u grupu degenerativnih obolenja.

Dijagnoza

Anamneza

Bolesnici se u podmaklim godinama žale na slabiji sluh. Oštećenje sluha progriježira i ono se javlja individualno u različitim godinama kod starijih ljudi. Anamnestički je važan podatak da ne postoji neki drugi uzrok oštećenju sluha.

Klinička slika

Lokalni ORL nalaz je uredan.

Funkcionalno ispitivanje

Ispitivanje sluha šapatom i glasnim govorom, zvučnim viljuškama i audiometrijski pokazuje tipičnu perceptivnu veću ili manju naglušost.

Dijagnoza se postavlja u ORL ambulantama.

Minimum za dijagnozu

- iscrpna anamneza u kojoj se moraju isključiti drugi uzroci perceptivne naglušnosti,
- lokalni ORL pregled,
- pregled sluha zvučnim viljuškama i audiometrom.

Prognoza

Bolest je progresivna. Ne može da se liječi. Koliko će oštećenje sluha biti zavisi od toga u kom životnom dobu se bolest javila i kako brzo napreduje.