

• Uvod • Dijagnoza • Prognoza

### Uvod

Aerootitis je obolenje koje se javlja kada se naglo povećaju razlike između atmosferskog pritiska spoljne sredine i pritiska u šupljini srednjeg uha. Ovo obolenje se javlja pri naglom penjanju u visini ili pri naglom spuštanju (npr. let avionom, pješaćenje planinara).

### Dijagnoza

#### Anamneza

Anamnestički se dobija podatak da je, npr. poslije penjanja ili spuštanja avionom bolesnik osjetio punoću, šum u uhu i smanjeni sluh. Katkada može doći do vrtoglavice sa mukom. Pri još većim razlikama u pritiscima javlja se vrlo intenzivan bol, koji može naglo da prestane poslije spontane ruptуре bubne opne.

#### Klinička slika

Zavisno od izraženosti obolenja može se konstatovati i različita otoskopska slika:

bubna opna može biti samo lako injicirana ili se na njoj mogu naći sitna krvarenja.

U kavumu timpani može da se pojavi eksudat koji brzo postaje hemoragičan, pa se otoskopski vidi tipična slika hematotimpanona.

Na kraju, može da se konstatuje ruptura bubne opne i to najčešće u stražnjim kvadrantima.

Funkcionalno ispitivanje

Ispitivavnjem sluha zvučnim viljuškama i audiometrom konstatuje se konduktivna naglušost.

Dijagnoza se postavlja u ORL klinikama i ORL odjeljenjima.

Minimum za dijagnozu

- anamneza,
- lokalni ORL pregled,
- ispitivanje sluha zvučnim viljuškama i audiometrom.

### **Prognoza**

Neliječeno obolenje može u težim slučajevima da se komplikuje gnojnim zapaljenjem srednjeg uha. Liječen aerootitis najčešće prolazi bez ikakvih posljedica.