

• Uvod • Dijagnoza • Prognoza

## Uvod

Kod kesonske bolesti, slično kao kod aerootitisa, zbog naglih promjena atmosferskog pritiska javljaju se promjene u srednjem uhu. Zbog vazdušnih embolija u labirintu dolazi do manjih ili većih oštećenja unutrašnjeg uha.

## Dijagnoza

### Anamneza

Radnik poslije izlaska iz kesona iznenada dobija napad vrtoglavice sa povraćanjem, znojenjem, šumom u uhu, oslabljenim sluhom, a katkada i potpunom gluhoćom.

### Klinička slika

Otoskopski nalaz može biti potpuno isti kao i kod barotraume.

### Funkcionalno ispitivanje

Ispitivanjem sluha konstatuje se mješovita ili perceptivna naglušost, a u težim slučajevima i totalna gluhoća.

Dijagnoza se postavlja u ORL ambulantama i odjeljenjima.

Minimum za dijagnozu

- anamneza,
- lokalni ORL pre-gled,
- pregled sluha zvučnim viljuškama i audiometrom.

### **Prognoza**

Promjene u srednjem uhu liječenjem mogu nestati. Neliječene ove promjene mogu se komplikovati zapaljenjem srednjeg uha.

Promjene u labirintu u lakšim slučajevima mogu se popraviti, a u težim perceptivna naglušost ili totalna gluhoća ostaju ireverzibilni.