

• Uvod • Dijagnoza • Prognoza

## Uvod

Ovo obolenje može da nastane kao rezultat više faktora: lo-kalne alergije i infekcije, poremećaja ventilacije nosa (deviatio septi nasi, itd.), obolenja iz okoline (sinusitis paranasalis, vegetatio adenoides, itd.) koja vrše stalnu iritaciju sluznice nosa. Pored ovih lokal-nih i opšti faktori: endokrini, neurogeni, profesionalni, ili neki dru-gi faktori organskog karaktera mogu da imaju uticaj na razvoj ovog obolenja.

## Dijagnoza

### Anamneza

Anamnestički se dobija podatak o dugotrajnoj i upornoj kijavici, uz eventualni podatak o nekom drugom oboljenju, stanju ili uzroku koji je do ovog obolenja doveo.

### Klinička slika

Lokalnim ORL pregledom u nosu se konstatuje hipertrofija sluznice, koja može da bude glatka ili papilama. Hiper-trofija se naročito izražava na donjim nosnim školjkama. Nekada to zahtijeva rez donje nosne školjke, koji ovako povećan zatvara nosne hoane.

Dijagnoza se postavlja u ORL ambulantomama.

### Minimum za dijagnozu

- anamneza,
- lokalni ORL pregled i
- snimak paranazalnih šupljina.

### **Prognoza**

Ovo obolenje neliječeno traje godinama i može da dovede do proširenja infekcije na okolne organe i do proširenja infekcije na do-nje respiratorne puteve.

Ako se liječi rezultati će biti utoliko bolji, ukoliko se pronađe uzrok ovog obolenja, pa se uz liječenje obolenja ukloni i uzrok koji je do njega doveo.