

• Uvod • Dijagnoza • Prognoza

Uvod

Primarni lues je vrlo rijedak i viđa se samo kod djece u pod-ručjima endemskog luesa. Sekundarni lues u ranom stadijumu može da izazove mukopurulentni rinitis. Najčešće luetične promjene na no-su su u tercijarnom periodu. Gume se javljaju na koštanim struktura-ma nosa, a kao posljedica guma dolazi do sedlastog nosa.

Dijagnoza

Anamneza

Zavisno od stadijuma i stepena razvoja bolesti, bolesnici se žale ili na kijavice ili na promjene do kojih je dovela luetična guma.

Klinička slika

Lokalni ORL pregled pokazaće o kakvim vrstama promjena se radi. Promjene se rinoskopski jedino mogu da di-jagnosticiraju u tercijarnom luesu.

Laboratorijski pregledi

Serološke reakcije otkriće nam prirodu obolenja.

Dijagnoza se postavlja u ORL ambulantama uz saradnju seroloških laboratorija.

Minimum za dijagnozu

- anamneza,
- lokalni ORL pregled i
- serološke reakcije.

Neliječeni lues evoluirao će sa svim opštim i lokalnim znacima.

Prognoza

Liječenje primarnih i sekundarnih promjena luesa na nosu je potpuno uspješno, dok kod tercijarnih promjena može doći do deformiteta koštane piramide, stenoza i atrezija nosnih šupljina. Po izliječenju luesa ovi deformiteti, koji mogu i estetski i funkcionalno da štete bolesniku, mogu se sa uspjehom plastično hirurški popraviti.