

• Uvod • Dijagnoza • Prognoza

Uvod

Urođeni rascjepi nepca mogu biti različitog stepena: samo meko nepce, meko i tvrdo nepce, oba nepca i alveolarni nastavak sa rascjepom gornje usne. Ovi rascjepi mogu biti jednostrani ili obostrani.

Ove anomalije se operišu u detinjstvu, a kao posljedica može da ostane unj-kav govor (otvorena rinolalija), i estetski manji ili veći deformitet.

Dijagnoza

Anamneza

Anamnestički se dobija podatak o urođenoj manji koja je već operisana i eventualnim sadašnjim tegobama bolesnika.

Klinička slika

Lokalnim pregledom može se naći rascjep ili ožiljak od operacije. Pri pregledu važno je utvrditi funkciju mekog nepca. Treba utvrditi koliko je ono u stanju da zatvori nazofaringealni otvor. Isto tako treba utvrditi kozmetske nedostatke.

Dijagnoza se postavlja u ORL ambulantama.

Minimum za dijagnozu

- anamneza i
- klinički pregled.

Prognoza

Ako se rascep operiše na vrijeme i uspešno i ako se poslije toga doda dobra fonijatrijska rehabilitacija, govor i izgled radnika mogu biti potpuno normalni.