

• Uvod • Dijagnoza • Prognoza

Uvod

- Strana tijela u jednjaku se zaglavljaju iz više razloga: Ako je strano tijelo veliko, ili ako je takvog oblika da ne može da prođe kroz jednjak kao normalni bolus (kost, pribadača, dio prote-ze, itd.).
 - Ako je jednjak oštećen u svojoj funkciji (najčešće uslijed benigne stenozе).
 - Ako je poremećen akt gutanja uslijed: poremećene inervacije, poremećenog opšteg stanja organizma, itd.

Dijagnoza

Anamneza

Bolesnik se najčešće žali da mu se zaglavilo strano tijelo u jednjaku, da poslije toga ne može da guta, da osjeća bol u grudima ili da osjeća prisustvo stranog tijela u jednjaku. On je najčešće zbog ovih tegoba uplašen.

Klinička slika

Strano tijelo se otkriva pri ezofagoskopiji. Opšte stanje bolesnika, ako nije došlo do komplikacije nije poremećeno.

Rendgensko ispitivanje

Snimak ili otkrije strano tijelo, ako ga je moguće rendgenski ot-kriti ili pokazuje okluziju jednjaka.

Dijagnoza se postavlja u ORL klinikama i ORL odeljenjima gdje postoje uređaji za ezofagoskopiju

Minimum za dijagnozu

- anamneza,
- lokalni otorino-laringološki pregled,
- ezofagoskopski pregled, a katkad i
- rtg pregled.

Prognoza

Ako se strano tijelo otkrije na vrijeme (a to je najčešće) ono se sa uspjehom ekstrahira. Poslije ekstrakcije bolesnik se dobro oseća.

Ako je strano tijelo perforiralo jednjak, ili je do ovoga došlo pri ekstrakciji, doći će do pojave medijastinita koji je vrlo opasno obolenje.

