

• Uvod • Dijagnoza • Prognoza

Uvod Intermitentna hidartroza je kratkotrajni, recidivirajući hidrops najčešće koljenog zgloba koji se javlja u pravilnim vremenskim intervalima bez znakova inflamacije zgloba i bez znakova opšteg sistemskog obolenja.

Javlja se obično između 15-45 godine, najčešće kod devojčica u pubertetu.

Dijagnoza Intermitentna hidartroza se manifestuje u vidu recidivirajućeg hidropsa najčešće jednog koljena, rijetko oba, izuzetno nekog drugog zgloba, bez lokalnih znakova upale zgloba. Hidrops traje 3-7 dana najduže. Intervali između recidiva su pravilni i mogu trajati 7-21 dan. Hidrops je bezbolan ili praćen slabim bolom zbog napetosti zglobne čaure

Ne postoje opšti znaci obolenja: temperatura je normalna, nema malaksalosti ni znojenja. Atrofija mišića oko koljenog zgloba se ne javlja.

Radiografski su zglobovi potpuno normalni.

Svi laboratorijski nalazi su u granicama normale.

Sinovijalna tečnost je normalnog viskoziteta, sadrži povećan broj leukocita sa 50% polimorfonukleara, i normalnom količinom proteina (ovo je tip promjena sinovijalne tečnosti koji se nalazi u traumatskom sinovitisu).

Histološki postoji zadebljanje sinovijalne membrane, proliferacija vili sinovijales, i laka infiltracija sinovije mononuklearnim ćelijama.

Funkcionalne karakteristike Obim pokreta u oboljelom zglobu može biti smanjen u toku napada.

Prognoza Intermitentna hidartroza se smatra inicijalnim sindromom reumatoidnog artritisa ili reumatoidnim artritismom blagog toka. U poznoj fazi bolesti može se razviti tipičan reumatoidni artritis.

Ukoliko bolest ostaje lokalizovana samo na jednom ili dva zgloba, recidivi mogu trajati cijelog života, a da ne dođe do funkcionalnih oštećenja zglobova, jer sama hidartroza ne ostavlja zglobne sekvele.

