

- Uvod • Simptomi i dijagnoza • Prognoza i liječenje

Uvod

U dezintegrativnom poremećaju naoko normalno dijete počinje se ponašati mlađe (nazadovati) nakon treće 3 godine života.

U većine se djece fizički i psihički razvoj događa na momente. Ponekad normalno dijete napravi korak unazad, npr. dijete koje zna ići na toalet počne mokriti u gaćice. Dezintegrativni poremećaj ozbiljna je bolest i može biti odgovorna kada se dijete starije od treće godine prestane normalno razvijati (pokazuje znake zaustavljenog razvoja) ili nazaduje. Uzrok je najčešće nepoznat, premda ponekad dijete ima degenerativno oštećenje mozga.

Simptomi i dijagnoza

Dijete sa dezintegrativnim poremećajem razvija se uredno do 3. ili 4. godine života, uči govoriti, koristiti toalet i normalno se socijalno ponašati. Nakon razdoblja nejasne bolesti i promjene raspoloženja, kada dijete postane iritirano i bolesno, počinje nazadovanje. Dijete može izgubiti prije naučeni govor, motorne i socijalne vještine, može izgubiti kontrolu mokrenja i zadržavanja stolice. S vremenom dijete propada sve do teško retardiranog stanja. Doktor na temelju simptoma postavlja dijagnozu i traži uzrok bolesti.

Prognoza i liječenje

Prognoza je loša, pa će jako retardiranom djetetu trebati doživotna njega. Dužina života djeteta može biti normalna ako nema neku drugu bolest. Dezintegrativni poremećaj se ne može liječiti niti izliječiti.